

Nouvelle découverte par M^r. Grivet, de la compagnie des Maîtres en Chirurgie de la ville de Saint. Germain en laye. Sur les moyens de - de parvenir à la Réduction des luxations inferieures de la Cuisse: par les effets combinés d'une machine de sa composition.

Parmi toutes les lésions de causes externes, qui arrivent aux hommes; il n'y en a point de plus dangereuses & de plus difficiles à redresser, que la luxation du fémur: par le déplacement de sa tête, lors qu'elle est sortie de sa cavité cotiloïde: tant par rapport aux rebords de cette cavité, plus ou moins considérables: & quel- que fois des boursoulés osseux, au dessous desquels peuvent se trouver certains enfoncements: joints à quelque autre défaut de conformation extérieure du bar- sin, qui en occasionne cette opiniâtreté; qui se trouve réunie de concert avec la force musculaire: pour en offrir toutes les difficultés, qui se font con- naître, principalement dans les adultes.

Si l'on a quelque fois réussi à cette réduction, ce n'a pu être que dans les jeunes Sujets, ou les rebords de cette cavité étoient moins considérables, & dont la force musculaire, étoit plus aisée à vaincre, que dans les adultes.

Lors que l'on veut bien faire attention à la Courbure du Col du fémur, de même qu'à la Courbure du Col de l'humérus; l'on ne doit pas être surpris de concevoir, qu'on a souvent employé les extenſions & Contre extenſions longitudinales, auxquelles on a encore ajoutées le Supplément de diverses machines; dans en tirer aucun succès, au point que le malade en demeure extropié.

mon but n'est point d'entreprendre le détail de toutes les autres luxations, du Corps humain ; ni de toutes les différentes luxations, qui arrivent par le déplacement de la tête du fémur, & de celles de l'humérus ; hors de leur cavité naturelle. mais je me borne simplement, à décrire les moyens qui doivent être employés, pour parvenir à la réduction de la tête du fémur : qui par son déplacement, se loge assez communément sur le trou ovalaire. ensuite de quoi je donnerai une — Observation sur la réduction de la tête de l'humérus, hors de la cavité de son Omoplate, logée sous la Clavicule. Je finirai par la description de la machine de ma composition, avec les moyens de son servir : pour parvenir à la réduction des luxations inférieures de la cuisse.

Malgré que l'on soit bien d'avis, que dans toutes les luxations inférieures de la cuisse, que celle où la tête du fémur est logée sur le trou ovalaire, soit la plus aisée à réduire: on a par-làissé que dy échouer assés communément, comme dans toutes les autres: sans pouvoir venir à bout d'en faire la réduction, tant par la supériorité de la force musculaire, que par les extansions longitudinales ordinaires & mal dirigées: auxquelles on a encore suppléé la machine ingénieuse de M^r Petit, fort inutilement.

² c'est donc sur cet expose, que j'ay l'honneur de représenter à vos bons avis; Messieurs, qu'il me semble que les raisons que j'ay celuy de proposer à votre illustre assemblée, sont contradictoires, en ce que les extansions & contre extansions longitudinales, qu'on a employés jus qu'à present, dans l'intention de parvenir à cette reduction: ne me paraissent pas avoir été des vrais-moyens Conciliables & Conformes à la Courbure du Col du fémur; ny même pour pouvoir vaincre la force Musculaire: afin de réussir à la reduction de la tête du fémur, dans sa Cavité Cotiloïde.

Ainsi les extansions & contre extansions longitudinales, qu'on a illusoirement employés jus qu'à present; pour vouloir parvenir à cette reduction, peuvent étre admises; étant legerement administrées, de la part de l'opérateur; pour servir à l'avenir de deux points fixes, tant du côté de la tête, que des pieds du malade: pour correspondre à deux autres moyens d'extansions Obliques, que je propose avec beaucoup d'esperance, pour vaincre la force Musculaire; qui occasionne cette forte pression de la tête du fémur, sur le trou ovalaire, qui se trouve étrangement comprimé. Dou il en résulte qu'au bout d'un certain tems, quelle se fait à cet endroit, une ^{autre} Cavité pour y loger, lors que la reduction n'a pû avoir lieu. Ce qui arrive à la faveur des divers mouvemens que le malade aura pû faire dans l'esperance de soulager sa douleur; ou bien même, qu'on les luy aura Conseillés, pour éviter que l'humour Sinoviale, en se païsant, la tête du fémur resterait enkilosée, sur le trou ovalaire. Outre qu'il en résulte que le malade en reste boiteux, la difficulté de pouvoir marcher; luy est encore un autre Surcrois des plus funeste, pour étre réduit à avoir son infortuné recours aux Bequilles.

Les deux nouveaux Moyens que j'ay l'honneur de proposer à votre respectable assemblée, Messieurs, pour parvenir avec succès, à la reduction de la tête du fémur, dans sa Cavité naturelle: se réduisent à l'extansion latérale Oblique Supérieure, & la Contre extansion Oblique inférieure; lesquelles seront exécutées par le moyen d'une Machine destinée à cet effet. pour lors l'extansion & contre extansion longitudinales, que l'on employait cy devant, dans l'intention de proceder à cette reduction; ne seront que legerement administrées, pour servir

Comme je l'ay déjà dit, de points fixes; tant du côté de la tête, que des 3 pieds du Malade: pour Contrebalancer celles que je viens de proposer. Si je dis que les extansions longitudinales, doivent étre legerement administrées; ce ne sera que dans le cas, ou la luxation de la Cuisse, qui pourroit étre trop allongée, par le déplacement de la tête du fémur, hors de sa Cavité naturelle.

Pour mettre en execution la nouvelle methode que je propose, pour réussir à la reduction de la luxation de la tête du fémur: il faudra avant toute chose, choisir un lieu exprès; qui soit assez grand & comode, pour y placer la nouvelle machine, qui je destine, pour proceder aux nouveaux moyens de l'extansion & contre extansion laterales obliques; que je divise en Supérieure & inférieure, pour les raisons que je dirai par la suite.

La Machine que je propose quand à present, n'est que le Centre configuratif de celle qui doit avoir lieu, pour servir à la reduction des luxations inférieures de la Cuisse: qui doit étre de six piés de haut, & sept piés en largeur: par rapport à une longue table un peu concave d'un pié & demy de large du côté de la tête du malade; sur laquelle il doit étre couché sur l'un de ses côtés, lors qu'il s'agira d'operer. C'est pour quoi elle est solidement enclavée entre les deux piliers de la machine: laquelle table n'est élevée, de bas en haut, que d'un pié & demi de terre; afin de ne point amoindrir les forces, que l'opérateur pourroit quelque fois avoir besoin d'employer, pour venir à bout de faire rentrer la tête du fémur dans sa Cavité naturelle; pendant que l'on procedera à l'execution de l'extansion oblique laterale Supérieure, Contre laquelle je propose trois Contres extansions, qui par leur points fixes serviront à la Contrebalancer. Ce sera par le moyen de cette extansion que la tête du fémur, doit étre ramené dans sa Cavité naturelle.

Cette table doit avoir cette longueur pour plusieurs raisons. en premier lieu, pour les Sujets qui se trouveront plus ou moins grands, sur lesquels il faudra proceder à la reduction de cette luxation.



4. Secondement pour les mortaises à jour de cette table, pour former le moyen de Contre extension latérale oblique inférieure; les quelles sont d'égale longueur depuis le milieu de la table en se terminant du Côté des pieds du malade, étant séparées par un entre deux, de quatre travers de doigts. Ces mortaises sont destinées pour le passage de chaque bout d'un laque, de dedans en dehors, par dessous la dite table; pour y attacher ainsi le Cordon, qui doit être destiné pour l'exécution de la Contre extension latérale oblique inférieure; ainsi nommée par rapport à la position d'un laque ouvert dans son milieu en manière de fronde, pour le placer sur la Crête de l'os des gles, du même Côté de la luxation de la Cuisse; en ressortant obliquement ses deux bouts, au tier milieu de la Cuisse opposée à la luxation, étant sortis au dehors des mortaises, pour y attacher le Cordon à chaque boutonnière, par dessous la table, pour se terminer obliquement à la première poulie de support, placée à l'angle inférieur de l'appandice transversale de la machine, faisant partie de cet angle, du Côté des pieds du malade. C'est ainsi que la longueur des mortaises de la table, sont nécessaires; tant pour correspondre obliquement à la mortaise de la voûte de la machine, qui est destinée pour l'exécution de l'extension oblique latérale supérieure; que pour le changement de place de sa poulie ambulante, par la facilité de plusieurs trous de traverses à la dite voûte. à l'appandice transversale au dessous de la table se trouve de même une mortaise à jour qui fait également face à l'entre deux des mortaises de la table. Cette mortaise se trouve aussi munie d'égale quantité de trous de traverses que la mortaise de la voûte, qui a de même sa poulie ambulante; pour correspondre par égalité aux sus dites extensions latérales obliques, selon comme le sujet sur lequel on doit opérer, se trouvera grand ou petit. C'est par cette même raison que l'on aura l'avantage de faire la réduction des luxations inférieures de la Cuisse; même à des enfants de tout âge.

troisièmement par rapport que la longueur de cette table se trouve encore nécessaire, pour faciliter les différentes étendues plus ou moins longues, des quatre extensions, qui doivent être exécutées pour procéder à la réduction des sus dites luxations.

C'est pour cette raison que je divise ces quatre extansions, en extansions latérales⁵ obliques, & en extansions longitudinales; mais ces dernières ne peuvent pour le présent, avoir lieu qu'en qualité de contre extansions. Je subdivise les deux extansions latérales obliques, en égard à la position du malade couché sur l'un de ses côtes en extansion latérale oblique supérieure, & en extansion oblique inférieure, qui se trouve réunie avec les contre extansions longitudinales; ce qui forme trois points fixes, qui sont destinés à contrebalancer les efforts que doit faire l'extansion latérale oblique supérieure, qui tend par ses efforts à soulever la tête de los, obliquement de bas en haut, pour luy aider à remonter dans sa cavité naturelle; avec son pouvoir de vaincre la force musculaire. La contre extansion latérale oblique inférieure, s'exécute sur la hanche du côté de la luxation, par le moyen d'un laque qu'on applique sur la crête de los des fémurs; dont les deux bouts passe par devant le pubis & l'autre sur les fesses du malade; & sortent par leur mortaise, pour attacher aux boutonnières du laque, le cordon, qui par son trajet oblique de haut en bas, contrebalance, l'extansion oblique supérieure. L'extansion oblique supérieure, & latérale, s'exécute par l'application oblique d'un laque plissé en dedans de la cuisse luxée, au dessous de la courbure du fémur, les deux bouts de ce laq ayant leur boutonnières auxquelles on y attache leur cordon en face des trochanters ou entre les deux; de la ce cordon fait un trajet oblique de bas en haut pour passer dans la première poulie placée à l'angle supérieur du côté de la tête du malade, à la route qui fait partie de cet angle; passe ensuite sur la seconde poulie de support placée au pilier qui fait partie du même angle supérieur, descend de haut en bas pour se terminer au treuil de la double Rouë à dents de Scie, qui est placée du côté de la tête du malade. en tournant cette Rouë, lors que l'on aura suffisamment assugetis la contre extansion latérale oblique inférieure, par le moyen de l'autre Rouë du côté des pieds du malade: l'on appercevra les progrès de l'extansion latérale oblique supérieure, contre la force musculaire, par la compression du laque au dessous de la courbure du col du fémur, que la tête se trouve soulevée pour être ramenée obliquement à rentrer dans sa cavité cotiloïde.

Les deux laques destinés à l'exécution de l'extansion & contre extansion latérales obliques, doivent être faits avec la peau de buffle, qui soit forte & mollette: telle que celle qu'on employe ordinairement, pour faire les ceinturons à couteau de chasse.

6 Le laque qui doit être posé Sur la Crête de l'os des gles, pour servir à l'extension de la Contre extansion latérale oblique inferieure, doit être taillé en biaisant, obliquement pour ses deux bouts à boutonnières, qui doivent sortir par dessous la table, pour y attacher le Cordon de la ditte Contre extansion. Ce laque est ouvert dans son milieu, afin d'amoindrir sa Compression Sur la Crête de l'os des gles; lequel doit avoir quatre travers de doigts pour sa largeur, dans les plus grands Sujets; & sa longueur doit être de quatre travers de doigts de plus que la grosseur du Corps Sur lequel il doit être appliqué; afin d'avoir la Commodité d'attacher le Cordon par dessous la table, dans ses deux boutonnières. Le Coude de ce laque doit être plus large, que du côté des deux bouts; qui ne doivent être, que de trois doigts de largeur.

Le laque qui doit être appliqué en dedans de la Cuisse luxée, dont son appui est au dessous de la Courbure du Col du fémur; doit être taillé obliquement de la même largeur pour son Coude d'application, sans avoir besoin d'être ouvert dans son milieu; mais le Sans de son obliquité, doit être du côté de la tête du malade; & sa largeur sera conforme à celui de la Crête de l'os des gles, excepté que sa longueur doit être attaché le Cordon de l'extansion latérale oblique superieure. Il faudra Coudre à ce laque une anse à panier, Sur le côté de son Coude, pour les raisons que je dirai dans la suite.

Il sera même très nécessaire d'avoir de plusieurs sortes de ces deux especes de laques, de peau de buffle pour assortir aux différentes grosseurs; tant du Corps, que Cuisse des Sujets de tout âges, Sur lesquels on doit les appliquer, pour proceder aux extansions obliques & latérales, que je distingue en Superieure & inferieure.

Pour proceder à l'extansion & contre extansion latérales obliques; l'on doit d'abord Commencer à poser obliquement Sur la Crête de l'os des gles, le laque ouvert au milieu de son Coude, en maniere de fronde; dont les deux bouts du laque ressortiront obliquement, l'un par devant le pubis & l'autre derriere les fesses du malade, au tier Superieur de la Cuisse opposée à la luxation, pour y attacher le Cordon, de la Contre extansion latérale oblique inferieure, aux deux boutonnières. Cela étant fait, l'on posera ensuite obliquement, dans le pli de la Cuisse luxée; dont le Coude de ce laque aura son point d'appui au dessous de la Courbure du Col du fémur, les deux bouts de ce laque se termineront obliquement au milieu des trochanters, pour y attacher le Cordon de l'extansion latérale oblique superieure. Mais l'on ne doit point proceder à ces deux extansion; que l'on ait auparavant assujettis les points fixes; tant du côté de la tête, que des pieds du malade; par l'extansion & contre extansion longitudinales; administrées Selon le besoin, pour contrebalancer les deux latérales que je propose. les quelles formeront ensemble, par leur reunion; à peu près la figure d'un X Romain.

Ainsi l'extansion laterale oblique Superieure, se trouvera executée du côté de la tête du malade; par rapport au trajet oblique, que fait le cordon de la dite extansion, pour passer de bas en haut dans la premiere poulie de support, placée à l'angle de la machine, qui fait partie de l'angle Superieur du côté de la tête du malade; pour passer ensuite à la seconde poulie de support, placée au pilier qui fait partie du dit angle Superieur dans la niche à mortaise séparée par un coude à coulisse sur lequel le cordon glisse de haut en bas, pour se terminer au treuil de la double Rouë à dents de scie: que l'on tournera par le moyen de la manivelle, pour proceder à l'execution de l'extansion laterale oblique Superieure: ainsi nommée, par la faculté de vaincre la force musculaire, en tirant obliquement de bas en haut, au dessous du col du fémur; pour soulever la tête de cet os, en luy aidant à remonter dans sa Cavité Costoïde, qui est son logement Ordinaire.

La Contre extansion laterale oblique inferieure, qui doit contrepondre aux efforts de l'extansion laterale oblique Superieure: sera obliquement executée, du côté des pieds du malade: par la disposition du laque ouvert au milieu de son coude, appliqué sur la crête de l'os des gles: ou il doit y faire compression, par rapport à la sortie oblique de ses deux bouts, dans les mortaises, pour y attacher le Cordon en dessous de la table dans ses deux boutonnières, en face du tier Superieur de la cuisse opposée à la luxation. Ce cordon passe ensuite au dessous de sa premiere poulie de support, qui est placée à l'angle inferieur de la spandice à mortaise, du côté des pieds du malade, entraverfant ce même angle pour passer dans sa seconde poulie de support, au bas du pilier qui fait partie du dit angle; cette poulie étant placée dans la niche à mortaise, sous laquelle passe le cordon, qui monte de bas en haut, en glissant contre, un coude à coulisse; pour se terminer au treuil de la double Rouë à dents de scie; qui est placée au même pilier du côté des pieds du malade; avec la même hauteur que l'autre double Rouë, ayant aussi sa manivelle à tourner, pour proceder à l'execution de la Contre extansion laterale oblique inferieure: ainsi nommée, pour contrebalancer obliquement du côté de la crête de l'os des gles, les efforts de l'extansion laterale oblique Superieure: qui occasionne cette compression. Malgré que cette Contre extansion soit bornée à un point fixe, pour le support de son extansion: il sera pourtant nécessaire que le dedans de la table soit matelassée en maniere de souffla, auquel serait une languette matelassée qui serait de la largeur de l'autre deux des mortaises, sur laquelle sera posée la hanche opposée à la luxation, pour éviter des meurtrissures de la part de l'intérieur des mortaises: ce que l'on pourra également observer, en cessant de tourner la double Rouë à dents de scie, sans que le bassin soit comprimé en dedans de la table, sur laquelle le malade est couché sur le côté opposé à la luxation.

8 Pour lors en cessant pour toujours de tourner cette Rouë, tout le pouvoir en-
appartiendra à la Rouë de l'extansion latérale oblique supérieure; jusqu'à ce que
la tête du fémur soit rentrée dans sa Cavité naturelle.

Ces deux laques étant ainsi appliquées avec obliques, sans être serrées; il ny aura
pas à craindre qu'ils soient Sujets à glisser, pour changer de places, pendant
l'exécution de l'extansion latérale oblique supérieure, & la Contre extansion oblique
latérale inférieure: par rapport à l'entrecroisement des deux obliques, en
ce que le laque, qui est appliqué au dessous du Col du fémur, en terminant son
obliquité du côté de la tête du malade, empêche celui qui est posé sur la Crête
de l'os des fém. de glisser. Il semble même que ce nouveau moyen d'extansion & con-
tre extansion latéralement obliques, doivent épargner à la tête du fémur beau-
coup moins de frottement, en se trouvant soulevée de bas en haut; par les efforts
obliques de l'extansion latérale oblique supérieure, pour vaincre la force muscu-
laire, en luy aidant à rentrer dans sa Cavité, comme d'elle même.

Ces laques seront beaucoup moins nuisibles, que ceux que l'on a si souvent employés
inutilement, pour les extansions & contre extansions longitudinales: attendu que ces
premiers, ne feront d'autres compressions; que sur leur point d'appui; tant sur la
Crête de l'os des fém., qu'au dessous de la Courbure du Col du fémur.

D'ailleurs cette nouvelle machine que je propose, à l'effet de procéder par cette
methode, à la réduction des luxations inférieures de la Cuisse; n'aura rien de fro-
yeable pour les malades, en ce que mon intention consiste, de luy donner la forme
d'un lit fermant à rideaux: sur lequel le malade pourra après la réduction de sa
luxation, rester couché, pour y être pansé, jusqu'au tems de sa convalescence.

Avant que de procéder à la réduction de la luxation de la Cuisse, il faudra préparer
le malade, par les Remèdes généraux ordinaires, au cas qu'il en ait besoin; après
quoi on le placera sur la table de la machine, pour y être couché sur le côté
opposé à la luxation; puis on commencera d'abord à placer les laques de
l'extansion & contre extansion longitudinales, qu'il faudra exécuter selon le besoin:
cela étant fait, on appliquera Mollement une Compresse pliee en quatre double
de la largeur environ de six travers de doigts, au dessous de la Courbure du Col
du fémur, dont les deux bouts Croiseront obliquement sur la Crête de l'os des
fém.; tant pour adoucir les Compressions des laques, que pour éviter^{quel} les tegumens
ne soient pincés entre leur frottement; pendant que l'on procédera à l'exécution
des extansions latérales obliques supérieures & inférieures.

Après avoir appliqué le laque de peau de buffle, sous la Crête de l'os des fém., lequel
est ouvert dans son milieu pour en adoucir la compression; qu'il faudra placer
de la maniere que je l'ay déjà indiqué. ensuite de quoi on placera le second laque
de peau de buffle au dessous de la Courbure du Col du fémur, auquel laque doit
être cousue une anse à panser sur l'un des côtés, soit en dehors ou en dedans de
la Cuisse, selon le pèce de luxation.

Si la luxation est antérieure, la tête du fémur se trouvant logée sur le trou ovalaire, pour lors le pied du malade est porté en dehors & son talon en dedans: c'est en pareil cas que l'anse à panier doit être cousue en dehors du laque. cela étant l'opérateur se placera derrière le malade, pour tirer cette anse à panier obliquement à luy, au cas qu'il soit nécessaire, pour aider à conduire la tête du fémur, dans sa cavité naturelle; tandis qu'un aide poussera le genou de la luxation contre l'autre genou du malade; pendant l'exécution de l'extension latérale oblique supérieure, que l'on tournera la roue du côté de la tête du malade, par gradation; attendu que chaque roue est munie d'une visière ou verrou, que l'on pousse entre les dents de scie; lors que l'on cesse de tourner. ce sera à la prudence & capacité de l'opérateur à diriger ces gradations.

Si la luxation de la cuisse est postérieure inférieure, la tête du fémur sera du côté ou peut être logée à l'échancreure sacro-sciatique: alors le talon de la luxation, c'est à dire du malade est porté en dehors & la pointe du pied en dedans: c'est pour cette raison que l'anse à panier doit être cousue en dedans du laque qui doit exécuter les effets de l'extension latérale oblique supérieure: pour parvenir à cette réduction, l'opérateur se placera entre le pubis & la région ombilicale du malade, pour tirer obliquement à luy l'anse à panier, en cas de besoin, tandis qu'un aide poussera le genou de la luxation un peu en arrière; mais cependant toujours contre l'autre genou du malade.

Messieurs selon l'honneur de vos approbations, ces moyens réunis & prudemment administrés; me paraissent non seulement d'une grande efficacité, pour vaincre la force musculaire; mais encore le vrai moyen de parvenir à la réduction de toutes les luxations inférieures de la tête du fémur: par les seules dispositions du nouveau moyen d'employer les extensions latérales obliques; ausquelles l'opérateur pourra donner tel degré d'obliquité, qu'il jugera convenable, pour parvenir à vaincre la force musculaire, selon l'espèce de luxation. C'est pourquoi j'ay établi deux poulies ambulantes, l'une supérieure à la mortaise de la voûte de la machine, & l'autre inférieure, qui est placée à la mortaise de l'appandice transversale; mais celle cy n'est destinée que pour le même degré d'obliquité qui appartient à la contre extension latérale oblique inférieure, que l'on ne pourra changer qu'en conséquence des sujets, plus ou moins grands. ausquels les extensions latérales doivent être plus longues ou raccourcies. il ne faudra cependant pas donner à l'extension latérale oblique supérieure, un degré d'obliquité qui soit trop perpendiculaire; car si le laque ou dessous du Col du fémur venait à glisser de sa place; il y aurait à craindre que le col de cet os pourroit se fracturer, pendant les efforts de l'extension latérale oblique supérieure; laquelle étant prudemment administrée,

10 est seule, capable de soulever la tête du fémur, par ses efforts contre la force musculaire, pour contribuer à la rentrée de sa cavité cotiloïde, avec très peu de frottement : étant aidée par l'appui de trois autres extansions de points fixes, pour la contrebalancer.

Il pourrait cependant quelque fois arriver certaines circonstances, dans les luxations inférieures de la Cuisse ; Comme, par exemple, lors que le membre se trouve peut se trouver raccourci ; par rapport à la crispation des muscles, qui occasionne une très forte pression de la tête du fémur, soit sur le trou ovalaire ou ailleurs ; ce que l'on connaît par le gonflement & les grandes douleurs que le malade ressent, avec la fièvre qui est de la partie. pour lors quand on aura employé les moyens de calmer les symptômes : il n'y aura rien à risquer d'en venir à l'exécution de l'extansion & contre extansion longitudinales, jusqu'à ce que l'on s'apperoive d'avoir gagné un certain avantage contre la force musculaire : ce que l'on pourra connaître lors que les deux genoux du malade se trouveront à peu près de niveau. alors il faudra Cesser ces extansions en les bornant à ce point fixe, pour en venir tout de suite à l'exécution de l'extansion & contre extansion latérales oblique ; en observant les règles que j'ay indiquées. afin que l'extansion latérale oblique supérieure, puisse avoir la facilité de soulever la tête du fémur, qui doit rentrer par ce moyen dans sa cavité naturelle : en faisant pousser par un aide, le genoux de la luxation, contre le genoux opposé. Mais pendant l'exécution de l'extansion latérale oblique supérieure, il sera nécessaire de relâcher à proportion l'extansion longitudinale ; sur laquelle elle doit remporter toute la victoire, contre la force musculaire, & la réduction de la tête du fémur dans sa cavité cotiloïde.

Pour ce qui regarde le pansement du malade avec le régime, l'on pourra se conformer à l'usage ordinaire, qu'on emploie pour le traitement des luxations de cette nature.

À l'égard des luxations inférieures ou collatérales de la tête de l'humérus hors de la cavité de son omoplate : des quelles je ne serais entré dans aucun détail, si ce n'était en considération d'une luxation de la tête de l'humérus logée sous la clavicule ; dont l'observation me paraît intéressante, pour être mise au jour. mais il s'en faut de beaucoup que les luxations de la tête de l'humérus, soient d'aussi difficile réduction que celles de la Cuisse : car elles sont beaucoup plus maniables pour en faire la réduction, sans même avoir besoin d'aucune machine pour vaincre la force musculaire, par des extansions superflues, comme nous le verrons dans mon observation. Il suffit pourvu qu'on ait été requis à tems, pour procéder à leur réduction : car les extansions ordinaires, que l'on pratique à ce sujet, sur tout quand elles se trouvent réunies avec le genou de l'opérateur ; sont suffisantes pour parvenir à la réduction de ces luxations.

La luxation inferieure de l'humerus dont la tête se trouve logée sous l'aisselle, n'est pas si difficile à réduire, que les deux luxations latérales inferieures; qui sont ou posterieures ou anterieures: mais la luxation anterieure, est presque toujours plus commune que les deux autres: par la disposition de la tête de l'humerus, qui se loge presque toujours sous la clavicule, après son déplacement de la cavité qui lui est naturelle. par rapport à la contraction du grand pectoral & le Coraco-brachial ^{par} la force contractive, tire la tête de cet os en devant.

Lors que la tête de l'humerus est sous l'aisselle, le bras du malade est élevé; sans qu'il puisse l'abaisser; pour cet effet l'opérateur passera une serviette pliée en triangle de la largeur de quatre travers de doigts, ou sera couffée une petite pelote molette de la largeur du creux de l'aisselle, ou elle doit y être appliquée; ensuite de quoi l'opérateur fera des deux bouts de la serviette, une anse à premier qui noiera à son Col: le malade étant assis sur une chaise bien basse, ou par terre s'il est nécessaire: & lors que l'on procédera aux extansions ordinaires; l'opérateur aura ses mains appuyées, sur chaque épaule du malade, pour tirer perpendiculairement de bas en haut, à lui, pour vaincre la force musculaire du grand Dorsal & le grand Rond; pour venir à bout de cette réduction.

Si la luxation est anterieure, c'est à dire que la tête de l'humerus soit logée sous la clavicule: il faudra placer le malade d'une manière convenable, sur une chaise bien basse; pour proceder à l'extansion & contre extansion ordinaire. l'opérateur étant placé derrière l'épaule de la luxation du malade, pendant l'execution de l'extansion, il passera ses deux mains, l'une par devant, & l'autre par derrière, pour croiser ses doigts les uns dans les autres, sous l'aisselle de la luxation: cela fait, il tirera obliquement de bas en haut, le bras luxé à lui, afin de vaincre la force musculaire du grand pectoral & le Coraco-brachial; pour aider à la tête de l'humerus à remonter dans sa cavité: pendant que ceux qui executent l'extansion, y contribueront de leur côté en favorisant en même tems, le mouvement d'adduction du bras; en marchant avec extansion, de deux ou trois pas, en devant de la poitrine du malade. Ce qui est très important de pratiquer, dans cette espece de luxation; pour aider à la tête de l'humerus, à rentrer dans la cavité de son Omoplate: Comme je le ferai remarquer par mon observation suivante.

Pour ce qui concerne la luxation latérale posterieure & inferieure de la tête de l'humerus hors de sa cavité; l'on pourra à peu près observer les mêmes règles, que l'on pratique pour la luxation anterieure: excepté qu'il faudra que l'opérateur soit placé par devant le malade, pour en faire la réduction.

Observation

Observation Sur la reduction de la luxation de la tête de l'humérus logée sous la Clavicule.

L'an mil Sept cent Soixante Cinq, le dix du mois de decembre: je fus Requis sur les neuf heures du soir; par l'épouse du sieur Remond, maître Menuisier de Saint Germain en laye; près de la grande fontaine, à l'entrée de la Rue de Pologne: pour visiter le dit sieur son mari, qui étoit beaucoup souffrant; depuis trois ou quatre jours; à la suite d'une luxation antérieure de la tête de l'humérus, du bras droit, qui fut d'abord prise, pour une prétendue tumeur dure; sur laquelle il fut ordonné d'y appliquer les Cataplasmes, faits avec la mie de pain, du lait & les jaunes d'œufs. Ce fut au bout d'une telle manœuvre, que je visitai le malade, auquel je fis faire les divers mouvemens du bras; mais par le défaut du mouvement d'adduction du bras, en devant de la poitrine, qui ne put avoir lieu, lors que je voulus porter le bras du malade en devant; ce qui me fit connaître l'existence d'une luxation antérieure de la tête de l'humérus logée sous la Clavicule.

Ce fut donc en pareil cas, que je proposai pour cet effet de faire la reduction de cette tumeur illusoire: qui n'étoit rien moins qu'une luxation de la tête de l'humérus logée sous la Clavicule: en conséquence de quoi je fis procéder à l'execution de l'extansion & la contre extansion ordinaire; pour en venir à la reduction. Ces extensions furent exécutées pendant bien longtems, par des hommes forts & robustes; qui se relayèrent à tour de rôle: le tout réunis aux forces de mes mains, que j'employai sans aucun succès, de pouvoir venir à bout de faire rentrer la tête de l'humérus, dans la cavité de son omoplate.

D'après tous les moyens inutiles, en me trouvant alors très fatigué; je perdis tout à fait courage & espérance, de revenir aux prises, pour remporter la victoire: en supposant que la force de mes mains, étoit insuffisante, pour pouvoir venir à bout de faire cette reduction. Ce fut donc ce motif qui me déterminà d'abandonner la partie; pour ne plus remettre les mains à l'œuvre. Pour cet effet, je pris le parti d'avoir recours à M^r Scherer, sur lequel je jettai mes vœux; comme étant l'un de mes confreres, nouvellement reçu maître en chirurgie, dans notre Compagnie, auquel j'avois beaucoup de confiance: non seulement pour la force de ses mains, mais encore au mérite personnel de ses talens les mieux distingués; pour venir à bout de faire cette reduction.

Il prit donc ainsi ma place auprès du malade, comme étant plus fort 13
que moi, pour venir à bout de faire cette réduction. pour cet effet,
il fit exécuter de nouveau l'extan sion & contre extan sion avec des Halais à
tous les Rôles, de la même manière infructueuse, que je m'y étois pris; ou
il se fatigua beaucoup plus longtems que moi, pour parvenir à cette re-
duction, qui ne put avoir son succès.

Lors que mon Confre eut un peu repris haleine, il passa sa main sous
l'aisselle de la luxation du malade; pour faire une anse à pansier avec les deux
bouts triangulaires de la serviette, qu'il noia à son Col, à dessein de remon-
ter la victoire contre la force musculaire, pour luy aider à remonter la tête
de l'humérus, en tirant avec la anse à pansier, en ligne perpendiculaire, de
bas en haut, pour la faire rentrer dans la cavité: pendant l'exécution
de l'extan sion & contre extan sion de la troisieme reprise qui parut enve-
nir, j'eus fort longtems avec ce dard, aussi inutilement qu'auparavant.

Ce fut en pareilles Circonstances qui quitta prise à son tour ainsi que moi. mais
sans perdre courage, il proposa un autre moyen plus sûr, sûr & efficace; pour
suppléer au défaut de celui qu'il venait d'employer sans succès. mais pendant
qu'il s'en fut chez luy, pour apporter ce moyen auxiliaire; qu'il avait proposé
à dessein de venir à bout de faire la réduction de la luxation. à peine mon
Confre fut il hors de chez le malade, que je fis reflexion sur la non valeur que
j'avois employée pour venir à bout de vaincre la résistance des deux muscles de
l'adduction du bras: étant convaincu de ma faute, je repris courage pour faire exé-
cuter pour la quatrième fois; en me comportant tout différemment qu'à ma première
entreprise: je me plaçai derrière l'épaule de la luxation du malade; alors je pas-
sai mes deux mains l'une par devant & l'autre par derrière sous l'aisselle du bras
droit, ou étoit la luxation: ou je croiseai mes doigts les uns dans les autres, ensuite
de quoi je tirai obliquement à moi, en le tenant ainsi embrassé au dessous de son
Col: pendant lequel tems, ceux qui furent destinés pour l'extan sion, contribuèrent
au mouvement d'adduction; en les faisant marcher avec extan sion, deux ou trois pas
en devant de la poitrine du malade. Ce fut en tenant cette Conduite, que j'eus l'an-
ticipée satisfaction de faire heureusement rentrer la tête de l'humérus du bras droit,
dans sa Cavité Naturelle: mais avec beaucoup moins de peine & de violence que
j'employai fort inutilement, dans ma première tentative d'entreprise.
Celle réduction fut faite, avant la rentrée de mon Confre chez le malade; auquel
j'appliquai le pansement. je luy prescrivis aussi le régime convenable; pour évit-
ter le pèrisssement de la jambe. à la suite de cette réduction. tant par la saignée
du bras opposé, que les différens mouvemens du bras malade; que je luy faisois
faire.

14 jours, avant chaque grand mal; & que je fusse en état de le faire, pendant long-temps, mais qu'il ne put pas, sur la fin du Batimant. Le malade fut redoublant qu'on au bout de trois semaines: qui fut en état de commander avec-quer aux affaires de sa profession.

Description de la Machine destinée pour faire la réduction des luxations inférieures de la Cuisse: inventée par M. L. Griet, de la Compagnie des Maîtres en Chirurgie, de la ville de Saint Germain en Laye: avec la manière de s'en servir pour parvenir aux réductions.

Méthodes

Cette Machine de mon invention à laquelle j'attribue l'heureux succès, pour la réduction des luxations inférieures de la Cuisse, par le déplacement de la tête du fémur, hors de sa Cavité Cotiloïde; n'est qu'un Configuratif décomposé. Ce, pour démontrer avec possibilité la manière d'exécuter la Configuration des extansions & Contre extansions latérales Obliques, tant la Supérieure, que l'inférieure: que je viens d'avoir l'honneur de proposer à votre respectable assemblée; pour parvenir avec efficacité aux réductions des luxations inférieures de la Cuisse: de même que la Manière de placer le malade, sur la table de cette machine, pour procéder aux dites extansions.

Ce Configuratif n'étant que le vrai modèle pour l'exécution de la main, d'œuvre; lequel posé sur ses pieds, se trouve quand à présent d'une figure carrée, en son dehors & en dedans: qui ne forme que le principal essentiel pour être le milieu du Batimant, attendu que tout le Corps du Batimant de cette machine ressemblera à un lit, plus long qu'un lit ordinaire; qui fermera par ses rideaux, pour cacher aux yeux du malade, tout le spectacle pathibulaire; duquel il ne s'en apercevra, qu'au moment de l'opération.

La machine qui doit être construite, pour la réalité de faire la réduction des luxations inférieures de la Cuisse, doit avoir cinq pieds & demi de haut & même six, pour éviter que l'opérateur n'attrappe quelque coup de tête contre la voûte: & huit pieds en conséquence, pour sa largeur longitudinale, en dedans des deux piliers: tant pour avoir la parfaite aisance des extansions longitudinales & les obliques, que pour favoriser les directions obliques des mortaises de la Charpente ou menuiserie, qui y doivent contribuer; comme il sera remarqué cy après.

Cette machine présente est composée de quatre pièces de bois, sans y com- prendre sa table, sur laquelle le malade est couché, sur l'un de ses côté, pour procéder à la réduction de la luxation de la Cuisse. On considère, premierement la voûte transversale d'un pilier à l'autre; au dessus des- quels elle est enclavée par enchevillage de sa jonction à chaque pilier.

15
au tier inferieur inferieur entres les deux piliers qui font partie du Corps de
cette machine est une longue table, enclavée solidement entres les deux piliers.
elevée d'un pied & demy de terre.

au dessous de la table, à demi pied de terre, est une traverse enclavée entre la
Tier inferieur des deux piliers, à la quelle j'ay donné le nom d'appandice à
mortais, ou appandice transversale. Chaque piece de bois, qui font Corps de la
machine doivent avoir l'épaisseur d'un demy pied & quatre travers de doigts en quarré.
On Considere, à la voûte transversale, qui fait partie de l'angle Superieur du côté
de la tête du malade, une mortaise perpendiculaire, de dehors en dedans, qui
commence à demi pied en dedans du même angle, & se termine au tier de
la voûte du côté des pieds du malade. Cette mortaise est destinée pour les
poulies sur lesquelles doit passer le cordon, qui est attaché au laque de l'extansion
latterale oblique Superieure. outre cela la longueur de cette mortaise designe
le besoin du changemant de place de la poulie, non seulement pour donner
la forme d'obliquité à cette extansion, mais encore à l'assortimant de la dite
extansion, selon que les Sujets sur lesquels il faudra operer, se trouveront plus
ou moins grands.

on remarque, à l'appandice transversale de cette machine, qui fait partie de
inferieur du côté des pieds du malade une mortaise perpendiculaire, de dessous
cette traverse en dedans, qui fait face oblique, à celle de la voûte; cette mortaise
commence à demi pied, en dedans de ce même angle, & se termine au tier
inferieur de l'appandice transversale, du côté de la tête du malade. Cette
mortaise est destinée pour la place des poulies, au dessous des quelles doit
passer le cordon qui est attaché au laque de la Contre extansion latterale
oblique inferieure. Cette mortaise est d'égale longueur que celle de
la voûte; pour les mêmes besoins du changemant de la poulie.

Par rapport au changemant de place de cette poulie, de même que cel
de la voûte qui jouit du même droit; je leur ay donné le nom de poulies
ambulantes, qui sont distinguées de quatre autres poulies que je
nomme les poulies de supports; pour diriger le trajet oblique de
chaque cordon attaché à son laque. Sçavoir deux Superieures pla-
cées à l'angle Superieur de la machine du côté de la tête du mala-
de; & deux inferieures placées à l'angle inferieur du côté des pieds
du malade: elle son placées à cloue rivées, pour ne point changer de
leurs places.

Chaque Mortaise, soit de la voûte, de l'appandice transversale, & celles
qui sont taillées en niches transversales de dehors en dedans des piliers de la
machine; pour les deux poulies de support, doivent être de trois doigts &
demy de larges.

16 on remarque, à la voute, de même qu'à l'appandice transversale de la machine les trous faits en travers de leur mortaise, d'un bout à l'autre: par égale quantité. Ces trous sont percés expret pour favoriser le changement de place, des deux poulies ambulantes; dont l'une est supérieure & l'autre inférieure. Ces trous doivent être d'égale distance les uns des autres; cette distance commence à la poulie de support au trois quart de la largeur de cette poulie, afin que se trouvant par besoin être pres l'une de l'autre, elles ne puissent se toucher. Les trous de la voute sont percés au tier supérieur de l'épaisseur du bois; & ceux de l'appandice transversale, sont percés au tier inférieur.

Entre l'espace des deux piliers, qui font partie du bâtiment ou construction de la machine, au tier inférieur à un pied & demy pres de terre, est enclavé entre les deux piliers, la table sur laquelle est couché le malade; pour procéder à la réduction de la luxation. Cette table occupe par sa longueur, l'espace qui est entre les deux piliers, pour contribuer à la longueur de quatre extansions. Cette table est solidement enclavée entre les deux piliers; on remarque qu'elle est large du côté de la tête, à deux pieds & demy de longueur, pour la position de la tête & du tronc du malade, ou elle commence à devenir étroite, en son reste de longueur du côté des pieds; afin que l'opérateur puisse trouver son aisance, pour le manuel des réductions. Cette table un peu concave doit avoir l'épaisseur de deux doigts & demi: & pour éviter que les dents de scie de la Rouë ne touchent la tête du malade, il est nécessaire de laisser un col d'un demi pied pour sa longueur, du côté de la tête; sans y comprendre son emboîtement au pilier, qui doit avoir l'épaisseur de quatre travers de doigts en quarré.

On considère à cette table ses deux mortaises, séparées par leur entre deux, qui se trouve au milieu de la table, qui fait face oblique & perpendiculaire, à la mortaise de la voute, & celle de l'appandice transversale. Elles sont percées à jour de dehors en dedans, à un pied & demi de distance, du pilier du côté des pieds du malade, en se terminant avec égale longueur que celle de la voute, & celle de l'appandice transversale. L'usage de ces deux mortaises est pour la sortie de chaque côté de la cuisse opposée à la luxation; des deux bouts du laque, qui passent de dedans en dessous de la table de trois travers de doigts ou plus, pour attacher aux deux boutonnières du laque, le cordon qui est destiné pour la contre extension latérale oblique inférieure.

On remarque à l'angle supérieur du pilier du côté de la tête du malade, une niche à mortaise taillée à demi pied en dedans du même angle, pour loger la ve corde poulie de support. Cette niche se trouve séparée par un coude à coulisse, fait par l'épaisseur du bois; sur lequel frotte le condon, en sortant de cette poulie, de laquelle il descend pour se terminer au treuil de la Rouë à dents de scie, qui est placée dans la niche au dessous du coude, du côté de la tête du malade; pour l'exécution de l'extension latérale oblique supérieure. Cette rouë est munie d'une virole qu'on pousse entre les dents de scie, lors que l'on cesse de tourner.

chaque double rouë avec son treuil doivent être d'une seule piece en fer, avec — 17
un trou de traverse percé au tiers milieu pour le passage du Cordon; Son trou de
traverse pour les pivots de chaque Rouë, doivent être quarrés; pour forcer leur
entrée à Coup de marteau dans leur Rouë.

À l'angle inferieur du pilier de la machine, du côté des pieds du malade; on y remarque
une niche à jour ou est logée la seconde poulie de support; laquelle se trouve separée
par un Coude à Coulisse sur lequel frotte le Cordon en sortant de passer au dessous
de cette poulie; de la quelle il remonte de bas en haut, pour se terminer au
treuil de la double Rouë à dents de Scie; qui est placée d'égale hauteur que l'autre
rouë, dans sa niche qui est au dessus du Coude, du côté des pieds du malade, pour
l'exécution de la Contre extension laterale, oblique inferieure. Chaque rouë doit
avoir son tournant en face de l'opérateur, afin que leur tourneur le regardent
en face, pour faire attention aux signes qu'il pourroit leur faire; soit pour
tourner ou cesser, lors qu'il le jugera à propos. C'est pourquoi chaque Rouë
est munie de sa visière ou verrou que l'on pousse entre les dents de Scie, en
cessant de tourner.

Au dessous de la rouë de la Contre extension laterale, oblique,
du côté des pieds du malade, en dedans de la machine, ou est placé un anneau,
doit y être posé à la place, une petite Rouë à dents de Scie avec son treuil,
qui sera postiche dans sa niche de fer avec un Col solide; pour être clouée
sur les cotés du dit pilier, qui sera munie de son cran ou visière; pour cesser
de tourner selon les differents degres de l'extension longitudinale, lors que l'o-
pérateur le jugera à propos. La manivelle de cette Rouë doit être placée du
côté opposé à l'autre manivelle, pour tourner également en face de l'opé-
rateur: pour les mêmes raisons que j'ay expliqué au sujet de l'extension
& contre extension laterales obliques.

au dessous de la Rouë de l'extension laterale oblique superieure, en dedans
du pilier, on remarque un anneau qui fait face à la petite double Rouë
à dents de Scie; lequel est destiné pour attacher les liens de la contre ex-
tension longitudinale.

à l'égard des poulies qui sont au nombre de six, que je distingue en poulie
de support, qui sont au nombre de quatre; d'avoir deux superieures, &
deux inferieures, qui ont leur place fixe, les embulantes sont au nombre de
deux, l'une superieure & l'autre inferieure. toutes ces poulies doivent être
de fer, ou bien de la racine de buis bien sec & nouveau.

Voilà Messieurs à quoi se réduit le long memoire que j'ay l'honneur de
vous presenter pour le bien commun de l'humanité. ayant celui d'être
vostres respektueux serviteurs.

Messieurs

Vostre tres humble & tres obeissant
Serviteur Grivet M^e en Chirurgie.

à S.^t germain en laye le 6. may 1778.

